

### Suicídio em Jovens

Carlos Guilherme Figueiredo
PSIQUIATRA
Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP

## **Conflitos de Interesses**



- Médico Psiquiatra da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – GDF.
- Diretor da Associação Psiquiátrica de Brasília
   APBr
- Diretor da Associação Brasileira de Impulsividade e Patologia Dual – ABIPD
- Coordenador da Psiquiatria da Clínica Saúde BRB
- Sem vínculos: políticos, ONGs, cargos públicos, laboratórios.

Resolução CFM nº 1.595/2000 Resolução ANVISA RDC nº 96/2008

# Definição



Ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal.

#### **Dados**



# Cerca de 1,3mi jovens morrem no mundo anualmente, vítimas de causas evitáveis ou tratáveis.


- 1. Trânsito: Principal causa de morte 11,6% do total;
- 2. Suicídio: responsável por 7,3% das mortes;
- 3. HIV/AIDS e infecções respiratórias
- **4. Violência:** o Brasil é o 6º país do mundo com mais homicídios de jovens.

(OMS, CDC, UNICEF / 2012)

### PORCENTAGEM DE SUICÍDIOS


Por idade, em países selecionados






# Distribuição dos Suicídios por Faixa Etária em São Paulo






#### **Tendências**







#### Suicídio em Adolescentes



#### Fatores de risco

- Afastamento dos pais biológicos;
- Divórcio dos pais;
- Suicídio dos pais, parentes próximos ou amigos;
- Dependência química = uso de álcool e drogas;
- > Para meninas:
- 10 a 14 anos = alto risco de intoxicação/envenenamento
- 15 a 19 anos = gravidez precoce/aborto é fator de risco

#### Suicídio em Adolescentes



 Estudos apontam que adolescentes que ficam mais de cinco horas em redes sociais e internet tem tem possibilidade 10 vezes maior de morte por suicídio.

 Aumento do número de suicídio em adolescentes nos últimos anos é alarmante: cerca de 30% de 2000 a 2012.

#### Suicídio em Adolescentes



#### **ATENÇÃO:**

- Mudanças de comportamento na escola e ambiente familiar:
  - Desinteresse em atividades antes prazerosas;
  - Deixa de participar das atividades em sala de aula;
  - Isolamento (em casa e grupo de amigos);
  - Queda do rendimento escolar;
  - Frases como "o mundo estaria melhor se eu não estivesse nele";
  - Outros indícios de depressão.





## OMS: Suicídio já mata mais jovens que o HIV em todo o mundo

Entidade revela que tirar a própria vida é segunda maior causa de óbitos entre pessoas de 15 a 29 anos; no Brasil, índice nessa faixa aumentou mais de 10% desde o ano 2000.

"[...] para a Organização
Mundial de Saúde, precisa
"deixar de ser tabu":
segundo estatísticas do
órgão, tirar a própria vida
já é a segunda principal
causa de morte em todo
mundo para pessoas de
15 a 29 anos de idade ainda que,
estatisticamente, pessoas
com mais de 70 anos
sejam mais propensas a
cometer suicídio."

Fonte: G1.com.br





Fonte: G1.com.br





"Dados do Mapa da Violência, do Ministério da Saúde, revelam que ele existe e está crescendo. De 2002 a 2012 houve um crescimento de 40% da taxa de suicídio entre crianças e pré-adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. Na faixa etária de 15 a 19 anos, o aumento foi de 33,5%".

Fonte: Saúde - iG



