Situação das mulheres em condições de abortamento no Nordeste brasileiro: resultados do estudo GravSus.NE

Paula Rego, "Sleeper" (A Dormir), 1994. Integra a coleção Dog Woman (Mulher Cão)

Sandra Valongueiro
Universidade Federal de
Pernambuco

Maio, 2015

*Morbimortalidade e Atenção ao
Aborto no Nordeste Brasileiro:
uma abordagem interdisciplinar e
multicêntrica*

Apoio

- Ministério da Saúde (Departamento de Ciência e Tecnologia- Decit) e Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNPq-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) Edital MCT/CNPq/MS/SCTIE/DECIT No. 54/2008
- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia-Fapesb (PPSUS)
- Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão –Fapema (PPSUS)

Estudo multicêntrico de universidades do Nordeste

Universidade Federal da Bahia

Musa – Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação Técnica em Gênero e Saúde, do Instituto de Saúde Coletiva

Universidade Federal do Maranhão

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Departamento de Saúde Pública

Universidade Federal de Pernambuco

Programa Integrado de Pós-Graduação em Saúde Coletiva / PIPASC

- Coordenação geral
 - Estela M. L. Aquino (UFBA)
- Coordenadoras locais
 - Greice Menezes (UFBA)
 - Thália V. Barreto-de-Araújo (UFPE)
 - Maria Teresa Alves (UFMA)
- Pesquisadoras/es
 - Sandra Valongueiro Alves (UFPE)
 - Maria da Conceição C. Almeida (FIOCRUZ/BA)
 - Eleonora Schiavo (UFBA)
 - Luci Praciano Lima (UFPE +)
 - Carlos Augusto Santos de Menezes (UFBA)
 - Lilian Marinho (UNEB)
 - Liberata Coimbra (UFMA)
- Secretaria/Apoio à Gerência de Projetos
 - Edileuza Rodrigues Santos

Problemática da pesquisa

- O aborto é grave problema de saúde no Brasil e particularmente no Nordeste
 - elevada a ocorrência de atos/procedimentos inseguros
 - impacto na morbimortalidade, com elevado potencial de evitabilidade
 - custos para as mulheres, a sociedade e o SUS
- Criminalização do aborto provocado e aspectos morais envolvidos: implicações no cuidado às mulheres, mesmo com abortos espontâneos

Problemática da pesquisa

- Complicações imediatas
 - Quadros leves até morbidade grave *near miss* e óbitos
 - Frequência e gravidade dependentes das condições de ocorrência:
 - idade gestacional
 - **procedimentos abortivos utilizados (aborto provocado)**
 - contexto social das mulheres
 - resposta dos serviços de saúde no tratamento dessas complicações

Problemática da pesquisa

Atenção Humanizada ao Abortamento: Norma Técnica
(MS, 2005, 2010)

- Reconhecimento do problema do aborto inseguro
- Definição da forma de organização da atenção

Objetivos do GravSus

- Caracterizar o perfil das complicações ligadas ao abortamento e analisar os fatores associados à gravidade destas complicações
- Avaliar a adequação e a qualidade da atenção prestada às mulheres admitidas por complicações do aborto em hospitais públicos do SUS, comparando três cidades do Nordeste: Salvador, Recife e São Luis

Métodos

- Estudo transversal multicêntrico
- População do estudo:
mulheres, com 18 e mais anos de idade, residentes nas três cidades, internadas por abortamento (espontâneo ou provocado) em hospitais da rede SUS
- Tamanho de amostra: 2800 casos
- Censo de 30 de agosto a 31 de dezembro de 2010, meses típicos (agosto a dezembro)

Produção dos dados

1. Inquérito epidemiológico: entrevistas com 2804 usuárias, questionário estruturado, próximo a alta hospitalar na unidade de saúde
 - Salvador: 1652
 - São Luis: 761
 - Recife: 391
2. Extração e transcrição de dados de prontuários, instrumento próprio da pesquisa, após a alta hospitalar
 - Tipo de aborto
 - Condições de chegada à unidade
 - Complicações do aborto

Produção dos dados

4. Observação participante em três hospitais de cada cidade, durante duas semanas, segundo:

- maior volume de atendimento
- menor razão parto/aborto
- existência de UTI, ensino de graduação ou pós-graduação e/ou serviço de aborto legal

5. Entrevistas com:

- Gestores das unidades
- Coordenação das centrais de regulação da rede assistencial
- Coordenação do SAMU

Aspectos éticos

- Conformidade aos princípios de respeito à pessoa, beneficência e justiça
- Confidencialidade
- Anonimato
- Consentimento informado oral

- Aprovação do projeto no sistema CEP/CONEP
 - Comitês de Ética das universidades envolvidas (UFBA, UFPE e UFMA) e CONEP (Resolução 346/05 - CONEP/CNS)

As entrevistadas

- **Características sociodemográficas**

- Idade mediana: 27 anos
- 50,4% pardas e 33,8% pretas
- 57% completaram o ensino médio
- 86% tinham renda familiar inferior a R\$ 1500

- **História reprodutiva**

- 23,8% primíparas
- 10,9% sem filhos, embora com gravidez anterior
- 71,2% tinham até dois filhos
- 35,2% com aborto anterior (dos quais 45,8% provocados)

Distribuição das mulheres por religião declarada, 2010.

- Católica
- Sem religião
- Pentecostal
- Protestante
- Espírita
- Umbanda / Candomblé
- Outra

Busca do atendimento

- Sangramento (62%) e dor (27%) motivaram o primeiro atendimento, buscado em um hospital público para a maioria das mulheres (74%);
- Uma em cada 10 mulheres enfrentou dificuldades para chegar ao hospital e, em quase metade dos casos (44%) por motivos relacionados ao transporte e deslocamento, incluindo congestionamento

Dificuldades institucionais citadas pelas usuárias para internação por aborto na rede SUS (n=888)

Salvador, Recife e São Luís - 2010

Ter se declarado de cor preta foi considerado o único fator para explicar a maior dificuldade de acesso ao serviço, sugerindo a possibilidade de prática de racismo institucional

Condições de chegada

- A maioria das mulheres apresentava boas condições de saúde: 94,1% (São Luis), 92% (Recife) e 90,1% (Salvador)
- Uma em cada sete usuárias apresentou complicações infecciosas ou hemorrágicas, exigindo uso de antibióticos, hemoderivados e/ou internação em UTI
- 4,8% das mulheres chegou grave ou muito grave
- Em Salvador, foi maior a proporção de morbidade grave near miss (18,9%) e foram registrados os 2 únicos óbitos no período

Complicações imediatas

A severidade dos quadros clínicos apresentados foi maior entre as:

- Mais jovens (18 a 24 anos)
- Negras (pretas e pardas)
- Menos instruídas
- Que nunca trabalharam
- Que declararam não estar em união conjugal.

Declaração do aborto

- 26,4% provocado
 - 32,3% em Salvador
 - 22,6% em São Luís
 - 8,4% no Recife
- 45,4% das mulheres que declararam que não queriam engravidar à época declararam o aborto como provocado;
- 31,5% das entrevistadas não estavam em uso de contracepção

Taxa de complicações por aborto (por mil mulheres) segundo tipo em três cidades do nordeste

Complicações*	Recife (n=366)	Salvador (n=1645)	São Luis (n=700)
Hemorragicas	41,0	39,5	8,6
Infecciosas	27,3	82,7	20,0

Fonte: Inquérito GravSus - Salvador, Recife e São Luis. 2010.

População: mulheres internadas por abortamento (espontâneo e provocado)

Fluxogramas assistenciais

Elementos comuns nas três cidades, contrariam normas de atenção ao abortamento

- Atendimento impessoal, com comunicação profissional/usuária breve e rápida, sem explicações sobre os procedimentos;
- Desrespeito à privacidade das mulheres;
- Atitudes de discriminação por parte dos profissionais;
- Longa espera das mulheres para realização do procedimento;
- Realização quase exclusiva da **curetagem** para esvaziamento uterino;
- Compartilhamento do mesmo espaço que parturientes nas enfermarias
- Alta burocrática, com poucas informações

Há distinções entre cidades, unidades e entre equipes plantonistas

Continuidade do cuidado

Indicadores (%)	Salvador	Recife	São Luís
Receberam orientação sobre cuidados pós-alta	35,0	51,7	20,0
Tiveram agendada consulta de revisão pós-alta	5,2	27,8	4,3
Receberam informações sobre planejamento familiar	35,5	25,6	3,2
Contraceptivos prescritos com orientação sobre onde obtê-los	14,7	7,9	1,1
Receberam orientações sobre risco de gravidez imediata	37,5	44,4	9,9

*Ideal = 100

Considerações finais/ discussão

- A atenção ao aborto, nas três cidades investigadas, encontra-se bem distante do que propõem as normas brasileiras e os organismos internacionais, incluindo acordos assumidos pelo governo brasileiro;
- Ênfase na dimensão curativa do cuidado
- Negligência na prevenção e nas ações que reforçam a autonomia das mulheres no processo de decisão sobre a reprodução

Recomendações

- Adoção pelos profissionais de postura ética independente de valores morais e religiosos, superando discriminação e desumanização do atendimento às mulheres
- Adoção de técnicas menos invasivas de esvaziamento uterino — aborto farmacológico e AMIU — em regime de hospital-dia, em serviços próprios para este tipo de atenção
- Reorganização da atenção hospitalar ao abortamento com reserva dos leitos obstétricos de internação de mais de 24 horas para casos com complicações e interrupções tardias que exigem cuidados mais complexos

Recomendações

- Garantia às mulheres do direito à informação e à autonomia, com o acesso ao conhecimento e aos contraceptivos para planejamento reprodutivo
- Estabelecimento de parâmetros e indicadores de avaliação da qualidade da atenção e da adequação às normas oficiais
- Avaliação regular da atenção, incluindo a satisfação das usuárias, de modo a embasar ações para a melhoria da assistência

Recomendações

- Efetivação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e do fortalecimento do SUS, assegurando os direitos reprodutivos e o direito à saúde em conformidade com os princípios de universalidade, integralidade e equidade da atenção
- Cumprimento dos compromissos internacionais (Conferências da ONU, ODM) e nacionais (1ª e 2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres)
- Garantia da laicidade do Estado, com revisão da legislação vigente.

Agradecimentos

- A equipe de campo e às 2.804 usuárias que generosamente concordaram em participar deste estudo contribuindo para a avaliação da qualidade da atenção pós-aborto no Sistema Único de Saúde.
- Aos gestores das Universidades Federais, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, entidades mantenedoras das instituições estudadas, bem aos diretores e profissionais destas unidades que permitiram a produção de subsídios para a melhoria da atenção às mulheres.