



Políticas públicas para o cuidado integral de pessoas com Alzheimer e outras formas de demência

o cenário brasileiro

Elaine Mateus - Presidente
febraz@febraz.org.br

Audiência Pública Interativa - Senado Federal
Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa
Out 2023





Nossa visão

Um país inclusivo das pessoas com demência, livre de estigmas, com práticas de redução de riscos, diagnóstico, cuidado, atenção e qualidade de vida disponíveis a todos, indistintamente.

febranz
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE ALZHEIMER



PESQUISA

FORTALECIMENTO
DA REDE LOCAL E
GLOBAL


INTEGRAÇÃO DOS
CONHECIMENTOS

Epidemiologia: o Brasil em números

Casos de demência no Brasil [1]


2019 ~1.8 milhão

2050 ~5.7 milhões



Comprometimento cognitivo sem demência [2]

2019 ~2.3 milhões



Menos de 3 em 10 pessoas com demência no Brasil recebem o diagnóstico [3]


[1] Global Burden of Diseases. Estimation of the global prevalence of dementia in 2019 and forecasted prevalence in 2050: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet 2022.

[2] Bertola L, et al. Prevalence of Dementia and Cognitive Impairment No Dementia in a Large and Diverse Nationally Representative Sample: The ELSI-Brazil Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2023 Jun 1;78(6):1060-1068. doi: 10.1093/gerona/glad025. PMID: 36682021.


[3] Nakamura AE, et al, Dementia Underdiagnosis in Brazil. The Lancet 2015. 385 (9966); 418-419.

Fatores de risco não modificáveis

Idade [2]



Sexo || Gênero [4]



Genética

[2] Bertola L, et al. Prevalence of Dementia and Cognitive Impairment No Dementia in a Large and Diverse Nationally Representative Sample: The ELSI-Brazil Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2023 Jun 1;78(6):1060-1068. doi: 10.1093/gerona/glad025. PMID: 36682021.

[4] Subramaniapillai, S. et al. Sex and gender differences in cognitive and brain reserve: Implications for Alzheimer's disease in women. Frontiers in Neuroendocrinology. v.60, Jan 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2020.100879> Acesso em: 12 de agosto de 2023.



FIGURE 1 Overall and relative population attributable fraction contributions of each dementia risk factor for rich (South and Southeast) and poor regions (North, Northeast, and Central West) in Brazil

Fatores de risco modificáveis



Baixa escolaridade 7.7%



Hipertensão 7.6%



Perda auditiva 6.8%

Suemoto, Claudia et al. (2022). Risk factors for dementia in Brazil: Differences by region and race. *Alzheimer's & Dementia*. 19. 10.1002/alz.12820.

Redução de riscos

No Brasil,
estima-se que



2 em cada 10 casos
de demência
estejam associados
à baixa escolaridade



3 em cada 10 casos
à inatividade física

A redução na prevalência de sete dos doze fatores de risco em 10% e 20% por década poderia, potencialmente, reduzir a prevalência de demência em 2050 em 8,7% e 16,2%, respectivamente, no Brasil [5]

[5] Oliveira DC et al. Reducing the Number of People with Dementia Through Primary Prevention in Mozambique, Brazil, and Portugal: An Analysis of Population-Based Data. J Alzheimers Dis. 2019;70(s1):S283-S291. doi: 10.3233/JAD-180636. PMID: 30664504; PMCID: PMC6700611.

Custos

2a

principal
causa de
morte entre
pessoas 70+
no Brasil [6]

USD
17m

custo
estimado
por PVD /
ano, no
Brasil [7]

2/3

do custo
corresponde
ao cuidado
informal
oferecido pela
família [7]



R\$ 150 bilhões por ano



1,5% do PIB Brasileiro

Quem cuida?





4 em cada 5
são mulheres





12 HORAS


Média das horas
diárias empreendidas
no cuidado, por familiares



Idade média 54



38% foi diagnosticado/a com
alguma doença após 12 meses
de iniciados os cuidados



Comparação das comorbidades entre cuidadores/as de PVD e indivíduos da população em geral



cuidadores/as de PVD




população em geral

Laks J, Goren A, Dueñas H, Novick D, Kahle-Wroblewski K. Caregiving for patients with Alzheimer's disease or dementia and its association with psychiatric and clinical comorbidities and other health outcomes in Brazil. Int J Geriatr Psychiatry 2015; 31(2):176–185. pmid:26011093



Score total do Brasil foi o mais baixo, comparado ao da Argentina, China, Índia and Arábia Saudita [8]

São Paulo teve o menor score [9]




Categories: Estratégia e Comprometimento;
Diagnóstico e Diagnóstico em tempo oportuno; Acesso ao cuidado; Suporte; Condições econômicas e tecnológicas

[8] Alzheimer's Disease International; Global Coalition on Aging. 2018. Dementia Innovation Readiness Index.

[9] Alzheimer's Disease International; Global Coalition on Aging; Lien Foundation. 2020. Dementia Innovation Readiness Index: 30 Global cities.

Compromissos

Demência como
prioridade



Conscientização e
inclusão



Redução de riscos
em demência



Diagnóstico,
tratamento e cuidado




Apoio a cuidadoras
e cuidadores



Sistema de
informação



Pesquisa e inovação
em demência



Princípios transversais



Obrigada

Elaine Mateus

<http://febraz.org.br>