

HOSPITAIS - FLUXO PARA SOLICITAÇÃO DE CLOROQUINA À SMS CURITIBA

Para solicitar CLOROQUINA 150MG COMPRIMIDO (Difosfato de cloroquina 250mg) à SMS Curitiba, o Hospital deverá comunicar, **conforme dia e horário**, o Serviço de Epidemiologia do Distrito Sanitário (SVE/DS) onde o hospital está localizado ou o Centro de Epidemiologia (CE/SMS):

- ✓ **Entrar em contato telefônico E**
- ✓ Enviar por e-mail os dados do paciente: **Nome completo, CPF, prescrição médica e quantidade dispensada** (quantidade dispensada no caso dos hospitais que receberam previamente um quantitativo do medicamento).

SEGUNDA A SEXTA das 8h às 18h:

<i>SVE/Distrito Sanitário (DS)</i>	<i>Telefone</i>	<i>email</i>
Bairro Novo	3298-6155	sve.dsbn@sms.curitiba.pr.gov.br
Boa Vista	3355-2680	sve.dsbv@sms.curitiba.pr.gov.br
Boqueirão	3313-5486 / 3313-5489	sve.dsbq@sms.curitiba.pr.gov.br
Cajuru	3221-2342 / 3221-2343	sve.dscj@sms.curitiba.pr.gov.br
CIC	3221-2885	sve.dscic@sms.curitiba.pr.gov.br
Matriz	3244-1741 / 3244-1748	sve.dsmz@sms.curitiba.pr.gov.br
Pinheirinho	3212-5655	sve.dspn@sms.curitiba.pr.gov.br
Portão	3350-3776	sve.dspr@sms.curitiba.pr.gov.br
Sanitário Santa Felicidade	3374-5022	sve.dssf@sms.curitiba.pr.gov.br
Tatuquara	3221-2688	sve.dstq@sms.curitiba.pr.gov.br

SEGUNDA A SEXTA das 18h às 8h, FINAIS DE SEMANA e FERIADOS:

- **Centro de Epidemiologia – CE/SMS:** 99961-5194 epidemio@sms.curitiba.pr.gov.br

Aguardar contato do SVE/DS ou CE/SMS para retirada do medicamento.

INDICAÇÃO CLOROQUINA EM PACIENTES HOSPITALIZADOS

(TERAPIA ADJUVANTE NO TRATAMENTO DE FORMAS GRAVES DO COVID-19)

O Ministério da Saúde do Brasil disponibilizou para uso, a critério médico, o medicamento cloroquina como terapia adjuvante no tratamento de formas graves, em pacientes hospitalizados, sem que outras medidas de suporte sejam preteridas em seu favor. A presente medida considera que não existe outro tratamento específico eficaz disponível até o momento. Importante ressaltar que há dezenas de estudos clínicos nacionais e internacionais em andamento, avaliando a eficácia e segurança de cloroquina/hidroxicloroquina para infecção por COVID-19, bem como outros medicamentos, e, portanto, essa medida poderá ser modificada a qualquer momento, a depender de novas evidências científicas. (NOTA INFORMATIVA Nº 5/2020-DAF/SCTIE/MS).

INDICAÇÕES DA CLOROQUINA NA TERAPIA ADJUVANTE NAS FORMAS GRAVES:

Conforme NOTA INFORMATIVA Nº 5/2020-DAF/SCTIE/MS, de 27/03/2020:

SITUAÇÃO CLÍNICA

- Pacientes hospitalizados com formas graves da COVID-19: dispneia, frequência respiratória ≥ 30 /min, $SpO_2 \leq 93\%$, PaO_2/FiO_2 50% dentro das 24 a 48 hs.
- Casos críticos da COVID-19: falência respiratória, choque séptico e/ou disfunção de múltiplos órgãos.

RECOMENDAÇÃO

- CLOROQUINA: 3 comp. de 150 mg* 2x/dia no 1º dia (900 mg de dose de ataque) seguido de 3 comp. 150 mg 1x/dia no 2º, 3º, 4º e 5º dias (450 mg/dia).

Para pacientes abaixo de 60 Kg, fazer ajuste de dose para 7,5mg/Kg de peso.

- Difosfato de cloroquina 250 mg comprimido equivale a 150 mg de Cloroquina base OU
- HIDROXICLOROQUINA: 1 comp. 400 mg 2x/dia no 1º dia (800 mg dose de ataque), seguido de 1 comp. 400 mg 1x/dia no 2º, 3º, 4º e 5º dias (400 mg/dia).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A escolha da antibioticoterapia ficará a critério da equipe médica do hospital de acordo com as recomendações da comissão de infecção hospitalar local.

- Realizar ECG (eletrocardiograma) antes do início da droga e acompanhar durante toda a internação o intervalo QT, pois a cloroquina pode aumentar esse intervalo, especialmente se utilizada com outras drogas que prolongam o QT. A suspensão se dará por avaliação clínica individualizada.
- Na presença de insuficiência renal ou insuficiência hepática graves, reduzir a dose de cloroquina para 50%.