

Maus tratos na infância e risco de suicídio



Fernanda Benquerer Costa


Médica psiquiatra

Diretoria de Saúde Mental – SES/DF e TSE

Panorama geral

- 13ª causa de morte no mundo
- 3ª no grupo etário dos 15 aos 34 anos
- 2ª causa de morte nos jovens dos 15 aos 19 anos
- As tentativas de suicídio representam a 6ª causa de incapacidade funcional permanente
- Há 10 a 20 tentativas para cada suicídio consumado
- Impacto nos sobreviventes: consequências emocionais, sociais e econômicas

Modelo teórico



Suicídio e transtornos mentais

- Transtorno mental como um dos fatores de risco mais importantes – 90%
- Tentativas prévias
- Situações de vulnerabilidade (abuso físico, sexual, psicológico ou negligência) e eventos de vida negativos podem precipitar o ato
- Bullying e cyberbullying

Automutilação

- Sem intenção suicida
- Cortes, queimaduras, escoriações
- Obtenção de alívio da angústia
- Associação a maior risco de comportamento suicida



Original Contribution

FREE

December 26, 2001

Childhood Abuse, Household Dysfunction, and the Risk of Attempted Suicide Throughout the Life Span

Findings From the Adverse Childhood Experiences Study

Shanta R. Dube, MPH; Robert F. Anda, MD, MS; Vinc

» Author Affiliations

JAMA. 2001;286(24):3089-3096. doi:10.1001/jama



Psychiatr Clin N Am 31 (2008) 223–235

PSYCHIATRIC CLINICS
OF NORTH AMERICA

Adverse Childhood Experiences and Suicidal Behavior

Beth S. Brodsky, PhD^a, Barbara Stanley, PhD^{a,b,*}

^aDepartment of Psychiatry, College of Physicians & Surgeons, Columbia University, NY, USA

^bNew York State Psychiatric Institute, Unit 42, 1051 Riverside Drive, New York, NY 10032, USA

ice and correlates of child sexual abuse: a national study

'érez-Fuentes^{a,b}, Mark Olfson^{a,b}, Laura Villegas^{a,b}, Carmen Morcillo^{a,b},
Shuai Wang^{a,b}, Carlos Blanco^{a,b,*}

^aNew York State Psychiatric Institute, New York, NY, USA

^bDepartment of Psychiatry, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, NY, USA

Eventos adversos na infância e saúde e bem-estar ao longo da vida



Mechanism by Which Adverse Childhood Experiences Influence Health and Well-being Throughout the Lifespan



Medidas de prevenção

- Tratamento adequado dos transtornos mentais
- Restringir acesso a métodos potencialmente perigosos
- Capacitar membros da sociedade para identificação e abordagem a pessoas em risco
- Fortalecer fatores de proteção: vínculos sociais, habilidades de resolução de problemas, autoestima dos adolescentes, expressão emocional

Uma política pública de prevenção

- Ações intersetoriais: educação, saúde, segurança pública, mídia
- Acesso a serviços especializados
- Conscientização da população
- Reduzir o estigma dos transtornos mentais
- Melhorias nas coletas de dados

Mais informações

<http://www.abeps.org.br>

benquerer@yahoo.com